

RECOLECCION DE MATERIA FECAL PARA ANTIGENO DE HELICOBACTER PYLORI

Indicaciones para niños que controlen esfínteres y adultos.

1. Utilizar recipiente estéril (el mismo que utiliza para recolección de orina orina)
2. Defecar en un recipiente limpio y seco. Recolectar de ahí una porción de materia fecal con cuchara o espátula y colocarla en el recipiente.
3. Conservar en la heladera, llevar al laboratorio antes de las 24hs de la recolección del material

Indicaciones para niños que no controlan esfínteres.

1. Colocar el pañal dado vuelta (la parte absorbente que quede por fuera).
2. Esto es para evitar que la muestra de materia fecal se absorba en el pañal.
3. Luego seguir los pasos del ítem anterior.

IMPORTANTE

Asegurarse de que la muestra no se contamine con orina.

Dos semanas antes de la recolección del material suspender preferentemente (considerando indicación médica) los siguientes medicamentos:

- Inhibidores de bomba de protones ((por ej., omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, etc)**
- Antagonistas del receptor H2 (Por ej., ranitidina)**
- Medicamentos que contengan bismuto**
- Antibióticos (si estuvo bajo tratamiento para la erradicación de Helicobacter pylori, esperar como mínimo 4 semanas).**